

## **Indicaciones para los pacientes con HPN en relación con el COVID-19** **Actualizado: 23/03/2020. Universidad de Leeds. Con leves modificaciones.**

En el estado actual de información sobre la infección del Coronavirus, le pedimos que consulte estas indicaciones antes de contactar con el Servicio de Hematología para que podamos responder mejor a sus preguntas.

Estas consideraciones están pensadas para todos los pacientes con HPN, estén en tratamiento o no. Consideramos que tiene un mayor riesgo que la población general de presentar complicaciones (HPN) y, por ello, debe Vd. Aislarse, lo cual es obligatorio.

- Asegúrese de tener un termómetro
- Tome su medicación tal y como su médico le ha indicado – por favor, asegúrese de tener suficiente cantidad
- Si tiene una temperatura de 38° o más, contacte con su médico del Servicio de Hematología, llámele por teléfono a la secretaría del Servicio de Hematología.
- Si tiene síntomas de HPN como orina negra o roja, contacte también a su médico hematólogo.

### **Además:**

- si se está tratando con un inhibidor del complemento (por ejemplo, Eculizumab –Soliris - ) es importante que:
  - o NO interrumpa su tratamiento.
  - o Se aconseja tomar profilácticamente ciprofloxacino 500 mg./día por boca.
  - o Soliris solo puede administrarse por un profesional sanitario en su Hospital o lugar en el que previamente le fue administrado.

**Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, para mantener una adecuada atención médica domiciliaria.**

### **Autoaislamiento**

Le recomendamos que siga las directrices oficiales del gobierno y esté en casa. Haga saber a su médico si algún familiar que conviva con Vd. Sospecha de padecer COVID-19, y se pueden tomar las precauciones adecuadas y continuar el tratamiento planeado.

### **Pacientes inmunocomprometidos**

Los pacientes inmunocomprometidos, es decir, los pacientes que reciben tratamiento para la anemia aplásica (ciclosporina y otros), y los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores del complemento (como el Eculizumab –Soliris-) deben de protegerse todo lo posible, para reducir el riesgo de infección, dentro de ello está el autoaislamiento.

**Qué debe tener en cuenta**

- Tenga un termómetro personal en casa.
- Anote la temperatura con fecha y hora en un cuaderno o calendario.
- Si no se encuentra bien, controle la temperatura regularmente.
- Definición de los síntomas respiratorios: dolor de garganta, tos, dificultad para respirar.
- Los pacientes con Eculizumab, en caso de tener fiebre, deben contactar con su hematólogo para valorar el caso e indicar el tratamiento antibiótico.
- No tome paracetamol para fiebre elevada, a no ser que se lo recete su médico.
- Su hematólogo le explicará quién es en su Hospital, si fuera necesario, el equipo que es responsable del COVID-19.

**Trabajamos en esta crisis para reducir el riesgo de exposición a COVID-19, si no se encuentra bien y se está tratando con Eculizumab –Soliris-, siga la normativa que especificamos en este escrito.**

**GRUPO ESPAÑOL DE HPN**